A découvrir...

Image not found or type unknown
bannière_780x265_fixe.jpg

ADVANTIX TRES PETIT CHIEN, ADVANTIX PETIT CHIEN, ADVANTIX CHIEN MOYEN, ADVANTIX GRAND CHIEN, ADVANTIX TRES GRAND CHIEN solution pour spot-on. Espèce de destination : Chien. **Composition :** pour 1 mL de solution: imidaclopride 100 mg, perméthrine 500 mg, butylhydroxytoluène (E321) 1 mg, excipients : qsp 1 mL. **Indications :** Chez le chien : Prévention et traitement des infestations par les puces (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*). Les puces présentes sur le chien sont tuées dans les 24 heures qui suivent le traitement. Un seul traitement prévient les ré-infestations par les puces pendant 4 semaines. Le médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite Allergique par Piqûres de Puces (DAPP). Traitement des infestations par les poux broyeurs (*Trichodectes canis*). Le produit possède une efficacité acaricide et répulsive persistant pendant 4 semaines (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*) et 3 semaines (*Dermacentor reticulatus*). Par son action répulsive et acaricide sur la tique vecteur *Rhipicephalus sanguineus*, le produit réduit la probabilité de transmission du pathogène *Ehrlichia canis*, réduisant ainsi le risque d'ehrlichiose canine. Les études ont montré que cette protection commence dès le 3ème jour après l'application du produit et persiste pendant 4 semaines. Les tiques déjà présentes sur le chien au moment du traitement peuvent ne pas être tuées pendant les 2 jours suivant l'administration du traitement et peuvent rester fixées et visibles. Aussi il est recommandé d'enlever les tiques présentes lors de l'application du traitement, afin d'éviter leur attachement et la prise de repas sanguin. Un seul traitement assure une activité répulsive (anti-gorgement) contre les phlébotomes pendant 2 semaines (*Phlebotomus papatasi*) à 3 semaines *(Phlebotomus perniciosus)*, contre les moustiques pendant 2 semaines (*Aedes aegypti*) à 4 semaines (*Culex pipiens*) et contre les mouches d'étable (*Stomoxys calcitrans*) pendant 4 semaines. **Contre-indications :** En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chiots âgés de moins de 7 semaines. Ne pas utiliser chez les chiens pesant moins de 1,5 kg. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue aux principes actifs ou à l'un des excipients. Ne pas utiliser chez les chats. **Effets indésirables :** En de très rares occasions, certains chiens traités pourront présenter une sensibilité cutanée passagère (telle que démangeaisons, grattements, frottement, perte de poils et rougeur au site d'application) ou une léthargie. Ces effets se résolvent généralement spontanément. Dans de très rares cas, certains chiens peuvent montrer des changements de comportement (agitation, nervosité, gémissement ou roulement sur le sol), des symptômes gastro-intestinaux (vomissement, diarrhée, hypersalivation, diminution d'appétit) et des signes neurologiques tels que des mouvements instables et des contractions musculaires en cas de sensibilité à la perméthrine. Ces signes sont transitoires et se résolvent spontanément. Une intoxication après ingestion accidentelle chez le chien est improbable, mais peut survenir dans de rares cas. Lors d'un tel évènement, des signes neurologiques tels que des tremblements et une léthargie peuvent survenir. Un traitement symptomatique doit être instauré. Il n'y a pas d'antidote spécifique connu. **Lire attentivement la notice avant utilisation**. **Catégorie :** Usage vétérinaire**. Titulaire d'AMM :** Bayer HealthCare - 220, avenue de la Recherche 59120 Loos - SAS au capital de 47.857.291,14 € - RCS Lille Métropole 706 580 149. **Exploitant :** Bayer HealthCare Animal Health – 10 Place de Belgique, Paris La Défense, 92250 La Garenne Colombes. V112017

Cet article est accessible par cette URL : http://www.coveto.fr/article-a-decouvrir----1659-184.html